

D Gebrauchsinformation

Tremazol • Wasseraufbereiter für Zierfische gegen Kiemenwürmer, Hautwürmer, Bandwürmer und Schuppenwürmer in Süß- und Meerwasseraquarien.

Gebrauchsinformation:

Gegen **Kiemenwürmer**: 1 ml Tremazol auf je 15 Liter Aquarienwasser zugeben. Gegen **Hautwürmer, Bandwürmer** und **Schuppenwürmer**: 1 ml Tremazol auf je 20 Liter Aquarienwasser zugeben. Das Mittel aus dem Dosierbecher über die Wasseroberfläche verteilen und dabei mit einem Löffel oder Stab ins Aquariumbecken einröhren. Nach 6 Stunden einen Wasserwechsel von mindestens 80 % durchführen. Sollte zuvor eine Trübung des Wassers eintreten, ist der Wasserwechsel unverzüglich vorzunehmen.

Bei Befall mit Kiemenwürmern muss nach 7 Tagen eine zweite Behandlung mit nachfolgendem Wasserwechsel durchgeführt werden.

UV-Lampen während der Behandlung ausschalten und das Aquarium gut belüften. Biologische Filter können angeschlossen bleiben.

Nach Abschluss der Behandlung empfehlen wir, das Wasser über **sera super carbon** zu filtern.

Anwendung außerhalb von Becken im Kurzbath: Diese Methode empfiehlt sich vor allem bei großen Wasservolumina.

Dosieren Sie Tremazol laut Gebrauchsinformation in einem kleinen Plastikbecken, in das Sie vorher Aquarienwasser gefüllt haben. Setzen Sie die erkrankten Fische für 20 Minuten in diesen Behälter und dann wieder zurück. Sorgen Sie während der Behandlung für eine gute Belüftung (z. B. Sprudelstein).

Zusammensetzung je 100 ml: Praziquantel, 7,47 g.

Unter Verschluss und für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen. Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt aufbewahren.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht in Aquarien mit Stachelhäutern (Echinodermata) anwenden!

US Information for use

Tremazol • Water treatment against gill and skin flukes, tapeworms and *Transversotrema* in freshwater and marine aquaria.

Directions for use:

Against **gill flukes**: Add 1 ml Tremazol for each 15 liters (4 US gal.) of aquarium water. Against **skin flukes, tapeworms and Transversotrema**: Add 1 ml Tremazol for each 20 liters (5.3 US gal.) of aquarium water. Use the measurement cap to distribute Tremazol on the water surface, and stir into the aquarium with a spoon or a stick. Carry out a water change of at least 80% after 6 hours. In case of water turbidity occurring in the meantime, carry out the water change immediately.

Repeat treatment plus water change after 7 days in case of infestation with gill flukes.

Switch off UV lamps during treatment and aerate the aquarium well. Biological filters may remain in operation.

We recommend to filter the water with **sera super carbon** after the treatment is finished.

Treatment outside the aquarium in a short bath: We recommend this method especially in case of large water volumes.

First fill a small plastic tank with aquarium water, then dose Tremazol according to the directions for use. Keep the sick fish in this tank for 20 minutes and then return them into aquarium. Ensure good aeration during treatment (e.g., by means of an airstone)!

Composition per 100 ml: Praziquantel, 7,47 g.

Keep under lock and key and out of reach of children and pets. Avoid contact with skin and eyes. Store at room temperature and away from light. Not to be used in conjunction with animals used for human consumption. Do not use in aquaria with echinoderms (Echinodermata)!

F Information mode d'emploi

Tremazol • Traitements de l'eau contre les vers des branchies, de la peau, Ténias et vers des écailles dans les aquariaux d'eau douce et d'eau de mer.

Mode d'emploi :

Contre les vers des branchies : verser 1 ml de Tremazol pour 15 litres d'eau d'aquarium. Contre les vers de la peau, Ténias et vers des écailles : verser 1 ml de Tremazol pour 20 litres d'eau d'aquarium. Répartir le produit contenu dans le doseur à la surface de l'eau en mélangeant dans l'aquarium avec une cuillère ou une baguette. Effectuer un changement d'eau d'au moins 80 % après 6 heures. Si l'eau devait se troubler, effectuer le changement d'eau immédiatement.

Pour les vers des branchies, renouveler le traitement au bout de 7 jours et effectuer un changement d'eau.

Couper les lampes UV durant le traitement et bien oxygénérer l'aquarium. Les filtres biologiques peuvent rester en marche.

Une fois le traitement terminé, nous recommandons de filtrer l'eau à travers **sera super carbon**.

Utilisation en-dehors du bac dans un bain : cette méthode est préconisée surtout pour les grands volumes d'eau.

Dossez Tremazol suivant le mode d'emploi dans un petit récipient en plastique que vous aurez rempli au préalable d'eau de l'aquarium. Placez les poissons malades pendant 20 minutes dans ce récipient, puis remettez-les dans l'aquarium. Veillez à une bonne oxygénation durant le traitement (p.ex. diffuseur d'air) !

Composition dans 100 ml : praziquantel, 7,47 g.

Conserver bien fermé et tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière. Ne pas utiliser sur des animaux destinés à la consommation. Ne pas utiliser dans des aquaria contenant des échinodermes !

Distributeur : sera France SAS, 25A rue de Turckheim, F 68000 Colmar • Tél. +49 2452 9126-0

Fabriqué en Allemagne

NL Gebruikersinformatie

Tremazol • Verzorgingsmiddel tegen kieuwwormen, huidwormen, lintwormen en *Transversotrema* in zoet- en zeewaterraquaria.

Gebruiksnaam:

Tegen **kieuwwormen**: 1 ml Tremazol per 15 liter aquariumwater toevoegen. Tegen **huid- en lintwormen** en **Transversotrema**: 1 ml Tremazol per 20 liter aquariumwater toevoegen. Het middel uit de doserbeker over het wateroppervlak verdeelen en daarbij met een lepel of stokje met het water in het aquarium mengen. Na 6 uur minimaal 80% water vervangen. Indien eerder het water daarvoor al vertrouwd moet het water direct worden vervangen.

Bij aantasting door kieuwwormen, moet er na 7 dagen een tweede keer worden behandeld. Ook dan moet het water weer op dezelfde wijze worden vervangen.

UV-lampen tijdens de behandeling uitschakelen en het aquarium goed beluchten. Biologische filters kunnen aangesloten blijven.

Na de behandeling adviseren wij om het water over **sera super carbon** te filteren.

Gebruik buiten de bak in een kort durend bad: Deze methode wordt vooral voor bij groot watervolume aangeraden.

Dosseer Tremazol volgens de gebruikersinformatie in een kleine plastic bak, die te voren met aquariumwater hebt gevuld. Zet de zieke vissen gedurende 20 minuten in deze bak en zet ze vervolgens terug in het aquarium. Zorg tijdens de behandeling voor een goede beluchting (b.v. met een bruissteenje).

Samenstelling in 100 ml: prazichantel, 7,47 g.

Afgesloten en ontsgankelijk voor kinderen en huisdieren bewaren. Niet in contact met huid en ogen brengen. Bewaren bij kamertemperatuur en beschermen tegen licht. Niet gebruiken bij dieren, die voor consumptie bestemd zijn. Niet gebruiken in aquaria met stekelhuidigen (Echinodermata)!

I Informazioni per l'uso

Tremazol • Trattamento per pesci d'acquario contro vermi delle branchie, vermi della pelle, tenie, vermi delle scaglie sia in acqua dolce e marina.

Istruzioni per l'uso:

contro vermi delle branchie: aggiungere 1 ml di Tremazol per ogni 15 litri di acqua nell'acquario. Contro vermi della pelle, delle scaglie e tenie: aggiungere 1 ml di Tremazol per ogni 20 litri di acqua nell'acquario. Distribuire il prodotto con l'apposito bicchierino dosatore sulla superficie dell'acqua e allo stesso tempo mescolarla con un cucchiaio o con un bastoncino. Dopo 6 ore cambiare almeno l'80 % dell'acqua nell'acquario. Se l'acqua diventa torbida prima delle 6 ore, il cambio dell'acqua deve essere eseguito immediatamente.

In caso di un'infezione di vermi delle branchie, deve essere fatto un secondo trattamento dopo 7 giorni con conseguente cambio dell'acqua.

Durante il trattamento spegnere le lampade UV e aerare bene l'acquario. Eventuali filtri biologici possono rimanere in funzione.

Dopo la fine del trattamento consigliamo di filtrare l'acqua con il **sera super carbon**.

Utilizzo fuori dall'acquario come breve bagno intensivo: questo metodo viene consigliato soprattutto nel caso di acquari molto grandi.

Dosate Tremazol secondo le istruzioni per l'uso in una piccola vaschetta di plastica riempita precedentemente con acqua dell'acquario. Mettete i pesci malati in questo contenitore per 20 minuti e poi rimetteteli nell'acquario. Fate in modo che durante il trattamento ci sia una buona aerazione, utilizzando p.es. una pietra porosa.

Composizione per 100 ml: praziquantel, 7,47 g.

Conservare in un armadietto chiuso e lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Evitare il contatto con pelle e occhi. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Non utilizzare in acquari con Echinodermi!

Importato da: sera Italia s.r.l., Via Gamberini 110, 40018 San Pietro in Casale (BO)

E Información para el usuario

Tremazol • Tratamiento contra gusanos de las branquias, gusanos de la piel, tenias y gusanos de las escamas en acuarios de agua dulce y salada.

Instrucciones de uso:

Contra gusanos de las branquias: aplique 1 ml de Tremazol por cada 15 litros de agua de acuario.

Contra gusanos de la piel, tenias y gusanos de las escamas: aplique 1 ml de Tremazol por cada 20 litros de agua de acuario. Reparta el producto con el dosificador por toda la superficie del agua y remueva el agua del acuario con una cuchara o un palo. Al cabo de 6 horas cambie al menos el 80% del agua. En caso de que el agua se enturbie, realice el cambio de agua inmediatamente.

En caso de que los peces estén afectados por gusanos de las branquias, debe repetir la aplicación al cabo de 7 días y realizar el cambio de agua correspondiente a continuación.

Durante el tratamiento debe apagar las lámparas UV y airear bien el acuario. Puede dejar los filtros biológicos conectados.

Una vez finalizado el tratamiento, recomendamos filtrar el agua con **sera super carbon**.

Aplicación fuera del acuario, baño en recipiente separado: Este método es recomendable sobre todo cuando el volumen de agua es muy elevado.

Aplique Tremazol según las instrucciones de uso en un pequeño recipiente de plástico relleno previamente con agua de acuario. Introduzca los peces enfermos durante 20 minutos en este recipiente y a continuación devuelvalos al acuario. Durante el tratamiento debe procurar que exista una buena aireación (p. ej. piedra difusora).

Composición en 100 ml: praziquantel, 7,47 g.

Conservarse bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños y animales de compañía.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz. No usar en animales destinados a la alimentación. ¡No lo aplique en acuarios que contengan equinodermos!

P Instruções para utilização

Tremazol • Tratamento contra parasitas das gueiras, parasitas da pele, parasitas cestóides e parasitas das escamas em aquários de água doce e salgada.

Instruções para utilização:

Contra parasitas das gueiras: adicione 1 ml de Tremazol por cada 15 litros de água do aquário. Contra parasitas da pele, parasitas cestóides e parasitas das escamas: adicione 1 ml de Tremazol por cada 20 litros de água do aquário. Distribua o preparado do recipiente de medição pela superfície da água e ao mesmo tempo mescolar com uma colher ou um pau. Após 6 horas façam uma mudança de água de pelo menos 80 %. No caso de aparecer antes uma turvação da água, deve-se fazer a mudança de água imediatamente.

No caso de uma contaminação com parasitas das gueiras, após 7 dias terá que ser feito um segundo tratamento, procedendo-se depois a uma mudança de água.

Desligue as lâmpadas UV durante o tratamento e areje bem o aquário. Os filtros biológicos podem-se manter ligados.

Após terminar o tratamento, recomendamos filtrar a água através de **sera super carbon**.

Tratamento fora do aquário, num banho de curta duração: Este método é recomendável sobre todo no caso de grandes volumes de água.

Dosifique Tremazol de acordo com as informações para utilização num pequeno depósito de plástico previamente cheio com água do aquário. Introduza os peixes enfermos durante 20 minutos neste depósito e coloque-os depois novamente no aquário. Assegure-se durante o tratamento que o aquário seja bem arejado (p.e.s. com uma pedra difusora).

Composição para 100 ml: praziquantel, 7,47 g.

Mantenha fechado à chave e fora do alcance das crianças e animais de estimação. Não deve entrar em contacto com a pele e com os olhos. Guardar à temperatura ambiente e longe da luz. Não deve ser usado em animais destinados a consumo humano. Não aplicar em aquários com equinodermos (Echinodermata).

S Produktinformation

Tremazol • Preparat för akvariefiskar mot gäl- och hudparasiter, bandmaskar samt fjällparasiter i söt- och saltvattensakvarier.

Brukasanvisning:

Mot **gałparasiter**: tillsätt 1 ml Tremazol per 15 liter akvarievatten. Mot **hudparasiter, bandmaskar och fjällparasiter**: tillsätt 1 ml Tremazol per 20 liter akvarievatten. Fördebla preparatet ur doseringsmåttet över vattenytan och rör om samtidigt med en sked eller pinne. Byt 80 % av vattnet efter 6 timmar. Om vattnet blir grumligt innan dess bör du byta vattnet omedelbart.

Vid angrepp av gałparasiter måste behandlingen upprepas efter 7 dagar med efterföljande vattenbyte.

Stäng av UV-belysningen under behandlingen och genomlufta akvariet väl. Biologiska filter behöver inte stängas av.

När behandlingen är avslutad rekommenderar vi att filtrera vattnet över **sera super carbon**.

Ärvändning i separat akvarium: Denne metod rekommenderas speciellt vid stora vattenvolymer.

Dosera Tremazol enligt brukasanvisning i ett litet plastakvarium som du har fyllt med akvarievatten. Flytta över de sjuka fiskarna till detta akvarium under 20 minuter och sedan tillbaka. Se till att lufta vattnet väl (t. ex. med syrestyen).

Sammansättning per 100 ml: prazikvantel, 7,47 g.

Förvaras oätkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med huden och ögonen. Förvaras vid rumstemperatur och skyddat för isjus. Preparatet får ej användas i akvarier med Echinodermata!

FI Käyttöohje

Tremazol • Vedenohtoinaine kidus- ja iholoisista, nauhamatoja ja *Transversotrema* matojen torjuuntaan makeaan- ja merivedenakaarioissa.

Käyttöohjeet:

Kiduloisten torjuuntaan: Lisää 1 ml Tremazolia jokaista akvaarioon 15 vesilitraa kohden. Iholoisten, nauhamatojen ja *Transversotrema* matojen torjuuntaan: Lisää 1 ml Tremazolia jokaista akvaarioon 20 vesilitraa kohden. Käytä mittakorkkia annostellessasi Tremazolia veden pintaan, ja kokea sen lisäksi tali tikkula, 6 tunnin kuluttua suoritetaan ainakin 80% vedenvaihto. Jos hoidon aikana ilmenee vedenantimista tee vedenvaihto välittömästi.

Uusi hoito ja edenvaihto 7 päivän jälkeen jos vielä näkyi kidusmatoja.

Sammesta UV valot hoidon ajaksi ja ilmasta akvaarioviessä hyvin. Biologiset suodattimet voivat olla käynnissä.

Suoosittelemme veden suodattamista **sera super carbonilla** hoidon jälkeen.

Lyyhy kylvetyshoitto muualta kuin akvaariossa: Suoosittelemme tätä hoitoon suilloisen akvaariotilan.

Täytä ensin pieni muoviaikaro akvaariovedellä, lisää siihen sen jälkeen Tremazolia käyttöohjeen mukaisesti. Kylvetä kalat muoviaikarvoissa 20 min ajan ja palauta ne sen jälkeen akvaarioon. Varmista että hoitoakvaariossa on hyvä ilmilstaus hoidon aikana (esim. ilmakiven avulla).

Koostumus per 100 ml: pratsikvantel, 7,47 g.

Säilytettävä lukuutta paikassa lasten ja lemmikkinä ulottumattomissa. Vältä ihon ja silmien joutumista kosketuksiin aineen kanssa. Säilytettävä huoneenlämmössä ja valoita suojailltu.

Ei saa käyttää elintarvikkeiksi tarkoitetulle eläimille. Älä käytä akvaarioissa joissa on piikkiknahkaisia (Echinodermata)!

DK Brugsinformation

Tremazol • Plejemeddel til prydansk mod gælleorm, bændelorm, *Dactylogyrus* og *Transversotrema* i fersk- og saltvandsakvarier.

Brugsanvisning:

Mot gælleorm: Tilsæt 1 ml Tremazol pr. 15 liter akvarievand. Mod bændelorm, *Dactylogyrus* og *Transversotrema*: Tilsæt 1 ml Tremazol pr. 20 liter akvarievand. Brug målebægeret til at fordele Tremazol, og rør med en ske eller en pins. Skift mindst 80 % af vandet efter 6 timer. Hvis vandet bliver grumset under behandlingen, skal det skiftes med det samme.

Gentag behandling og vandskift efter 7 dage i tilfælde af tilbagevendende gælleorm.

Sluk UV lamperne under behandlingen og luft akvariet godt. Biofilter skal være i gang.

Vi anbefaler **sera super carbon** til filtrering af vandet, når behandlingen er afsluttet.

Behandling udenfor akvariet: Vi anbefaler denne metode, hvis der er tale om meget store akvarier.

Fyld akvarievandet i en lille beholdere og tilsæt Tremazol efter brugsanvisningens forskrifter. Opbevar de syge fisk i den lille beholdere i 20 minutter og læg dem derefter tilbage i akvariet. Sørg for god tiltræng under behandlingen. (f.eks. ved brug af luftsten)

Sammensætning pr. 100 ml: Praziquantel, 7,47 g.

Opbevares utgångeligt for barn og husdyr. Undgå kontakt med hud og øjne. Opbevares mørkt og ved stuetemperatur. Må ikke anvendes til dyr, der bruges i fødevarer. Må ikke anvendes i akvarier med Echinodermata!

GR Γενικές Πληροφορίες

Tremazol • Θεραπευτική ογκύλη στα πάροπτα των βραγχών και του δέρματος, του κεστοειδή οκάληκα και των Transversotrema σε ενισχυόμενο και βαθασανού νερό.

Σημείωση χρήσης:

Για την αντιμετώπιση παρασίτων των βραγχών. Προσθέστε 1ml Tremazol για κάθε 15 λίτρα νερού ενυδρείου. Για την αντιμετώπιση παρασίτων του δέρματος, του κεστοειδή οκάληκα και των Transversotrema: Προσθέστε 1ml Tremazol για κάθε 20 λίτρα νερού ενυδρείου. Για τα διάφορα τα Tremazol στην επισκεψία του νερού χρησιμοποιήστε το κατόπιν μέτρησης, και ανακατεύστε με το υπόλοιπο νερό ώστε κατόπιν ή είναι ραβδί. Πραγματοποιήστε μια μερική αλλαγή νερού - αλλάζοντας τουλάχιστον 80% του νερού μετά από 6 ώρες. Εάν στο μεταξύ διαπιστώσετε θολούρα στο νερό, πραγματοποιήστε άμεσα την αλλαγή νερού.

Σε περίπτωση μόλυνσης από πάροπτα των βραγχών επαναλάβετε τη θεραπεία και την αλλαγή νερού μετά από 7 μέρες.

Κατά την διάρκεια της θεραπείας απενεργοποιήστε τις λάμπες UV και αερίστε το ενυδρείο καλά. Τα

βιολογικά φίλτρα μπορούν να παραμένουν σε λειτουργία.

Σας συμβουλεύουμε να φιλτράρετε το νερό με sera super carbon αφού ολοκληρώσετε την θεραπεία.

Θεραπεία σε μικρή λεκάνη εκτός ενυδρείου: την μέθοδο αυτή σας την προτείνουμε ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου.

Πρώτα γείστε ένα πλαστικό δοχείο με νερό ενυδρείου, μετά προσθέστε την δόση Tremazol ανάλογα με τη σύγχρονη χρήσης. Κρατήστε τα δώρωμα ψάρια σε αυτό το δοχείο για 20 λεπτά και μετά ξενοποιήστε το πάνω επάνω. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλός αερισμός (π.χ. χρησιμοποιώντας μια αεραπτέρα)!

Σύντομη ανά 100ml: προσκόπτελη, 7,47g.

Αποθηκεύτε το σε κλειδωμένο πουλόπι μαρκά από πανίδια και κοτοκιδια ζάχαρα. Μην αφήστε το προϊόν να ερθεί σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας. Φύλαξτε το οκέανομά σε δεμματά διάμαντου και αποφύγετε την απελευθέρωσή του σε ηλιακό φως. Μην το χρησιμοποιείτε για ζωά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ενυδρέρ με Echinoderm!

SI Navodilo za uporabo

Tremazol • Pripravek za okrasne ribi proti zajedavcem na škrghah, koži in notranjih organih (črevesju) v sladkovodnih morskih akvarijih.

Uporaba:

Proti zajedavcem na škrghah – sesači (*Trematoda*); dodajte 1 ml Tremazola na vsakih 15 litrov akvarijske vode. Proti zajedavcem na koži – sesači (*Trematoda*) in proti trukljanim (*Cestodes*) v črevesju; dodajte 1 ml Tremazola na vsakih 20 litrov akvarijske vode. Pripravek iz dozirne posode parozdelite po vodni površini in ga pri tem z žlico ali s palico zmiješajte u akvarijsko vodo. Po 6 urah morate zamenjati najmanj 80% vode. V primeru, da pred tem postopkom postane voda motna, jo morate vsakrat zamenjati.

V primeru, da so napadli ribi zajedavci na škrghah morate po 7 dneh postopek ponoviti in ponovno menjati vodo.

Med postopkom izključite UV-zarnice in akvarij dobro prezačujte. Biološki filtri so lahko priključeni.

Priporočamo vam, da po končanem zdravljenju filtrirate akvarijsko vodo skozi filtrino oglje sera super carbon.

Uporaba pripravka izven akvarija v kratkotrajni kopeli: To metodo priporočamo predvsem pri akvarijih z veliko vodno prostornino.

Dajte v majhno plastično posodo, ki ste jo pred tem napolnili z akvarijsko vodo, takšno količino Tremazola, ki je predpisana v navodilih za uporabo. V to posodo za 20 minut preselite iz akvarija obolele ribe in jih nači ponovno vrnite v akvarij. Poskrbite med zdravljenjem za dobro prezačevanje (np. z razpršilnikom).

Sestava na 100 ml: prazkvantel, 7,47 g.

Hranite dobro zaprt in izven dosegja otrok in domačih živali. Pripravek ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Shranite pri sobni temperaturi in zaščitite pred svetlobo. Ne uporabljati pri živalih, ki so namenjene za prehrano. Pripravka ne uporabljajte v akvarijih z iglokožci (Echinodermata)!

H Felhasználási információ

Tremazol • Vízelőkészítési diiszálak számára kopolytféreg, bőrféreg, galandférgek és pikkelyférgek ellen édesvíz és tengeri akváriumokban.

Használati információ:

Kopolytférgek ellen: adjon 1 ml Tremazol-t minden 15 liter vízhez. Bőr-, galand és pikkelyférgek ellen: adjon 1 ml Tremazol-t minden 20 liter vízhez. A szert osztassa el az adagoló pohár segítségével a víz felületén mikánnal vagy rúdral az akváriumba keveri. 6 óra elteltével minimum 80%-os vízcserét kell elvégezni. Ha a víz ez idő előtt zavarodosna, úgy a vízcserét azonnal meg kell kezdeni. A kopolytférgek fertözés esetén a kezelést 7 nap elteltével meg kell ismételni.

Kapcsolja ki az UV-lámpákat a kezelés alatt, és jól szellőztesse át az akváriumot. A biológiai szűrők működtethetek.

A kezelés befejezése után javasoljuk, hogy szűrje a vizet a sera super carbon-on keresztül.

A medencénben kívül kezelés rövid fűrdővel: ezt a módszert főként nagy vízmennyiséggel esetén javasoljuk. Adagolja a Tremazol-t a használati utasítás szerint egy kis müanyag medencébe, melybe előzőleg az akvárium vízéből töltött. Helyezze a megbetegedett halat 20 percre a medencebe, majd vissza az akváriumba. Gondoskodjon a kezelés alatti a megfelelő szellőzésről (pl. porlasztók)!

Osszesítetlen 100 ml-ben: prazkvantel, 7,47 g.

Lezárást és gyerekkelőt és háziállatoktól elzárva tárolni. Ne érintkezzen a bőrrel ill. ne kerüljön a szembe. Szobahőmérsékleten és fénytől védejt helyen tárolni. Ne használja üléményezés céljára tartott állatoknál. Ne használja tüskésbörököt (Echinodermata) tartalmazó akváriumokban! Forgalmazo: sera Akvariszta Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 75.

PL Informacje o zastosowaniu

Tremazol • Kuracja wodna dla ryb ozdobnych przeciwko pasożytem skórnym, skrzelowym, tasiemcom i Transversotrema w słodkie i słonowodnym akwarium.

Instrukcja stosowania:

Przeciwko pasożytom skrzelowym: Dodaj 1 ml Tremazolu na każde 15 litrów wody w akwarium. Przeciwko pasożytom skórnym, tasiemcom i Transversotrema: Dodaj 1 ml Tremazolu na każde 20 litrów wody w akwarium. Użyj przykrywki z miarką do dawkowania Tremazolu, następnie pomieszaj wodę z cytryną lub patyką. Po 6 godzinach podmień 80% wody. W przypadku pojawiającego się w międzyczasie zmniejszenia należy natychmiast podmienić wodę.

Po 7 dniach powtórz leczenie oraz podmień wodę w przypadku zakażenia pasożytami przywry skrzelowej.

Wyłącz lampy UV w czasie leczenia i dobrze napowietrzaj akwarium. Biologiczne filtry może pracować podczas leczenia.

Po zakończeniu leczenia zalecamy filtrowanie wody przy użyciu sera super carbon.

Leczenie poza akwarium w krótkiej kapeli: polecamy tę metodę zwłaszcza w przypadku dużych objętości wody.

Najpierw napełnij mały plastikowy zbiornik wodą z akwarium, następnie dodaj Tremazol zgodnie z instrukcją użycia. Trzymaj chory ryby w zbiorniku przez 20 minut a następnie wpusź je do akwarium. Zapewni dobre napowietrzenie w czasie leczenia (np. używając kamienia do napowietrzań)!

Sztoszenie na 100 ml: prazkvantel, 7,47 g.

Trzymać w zamknięciu pod kluczem z dala od dzieci i zwierząt. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od światła. Nie może być stosowany dla zwierząt przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi. Wyłączanie dla zwierząt przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi. Wylaczanie dla zwierząt z gwiazdkami (Echinodermata)!

Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora

CZ Informační popis

Tremazol • Léčivo pro okrasné ryby proti žaberním, kožním červům, tsemennici a Transversotrema ve sladkovodním a mořském akváriu.

Návod k použití:

Proti žaberním červům: přidat 1 ml přípravku Tremazol na každých 15 litrů akvarijní vody. Proti kožním červům, tsemennici a Transversotrema: přidat 1 ml přípravku Tremazol na každých 20 litrů akvarijní vody. Přípravek rozdělí pomocí dávkovačového poháru po hladině a potom pomoci lžíce nebo nejlepší tyčky zamíchat do vody v akvariu. Po 6 hodinách provět vyměňte vyměňte 80% vody. Jestliže se již předtím vyskytlo zakalené vody, je třeba provět vyměnu vody okamžitě.

Při napadení žaberními červy je nutné provět druhou lžíci po hladině a pak zdejšímu vyměnit 80% vody. Jestliže se již předtím vyskytlo zakalené vody, je třeba provět vyměnu vody okamžitě.

Během léčby vypnout UV-lampu a zajistit dobré vzduchování akvária. Biologické filtry lze nechat zapojené.

Po ukončení léčby doporučujeme přefiltrovat vodu přes sera super carbon.

Použití mimo akvárium v separátní lázni: tato metoda se doporučuje především při velkém objemu vody.

Aplikujte dávkou přípravku Tremazol podle návodu k použití v malé plastové nádrži, kterou jste předtím naplnili vodou z akvária. Přelovte napadené ryby na 20 minut do této nádrže a pak zpět do akvária. Během léčby zajistěte dostatečné vzduchování (např. vzduhovacím kamínkem)!

Složení na 100 ml: prazkvantel, 7,47 g.

Skladovat pod zámkem a chránit před dětmi a domácimi živalmi. Ne upřednostňujte v akváriích s Echinodermata!

Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora

TR Kullanım bilgileri

Tremazol • Sü düzenleyici ilaç tatlı su ve tuzlu su akvaryumlarında solungaç ve deri çürüme-rine, Transversotrema ve tenyalara karşı.

Kullanım talimatı:

Solungaç çürümelerine karşı: Her 15 litre akvaryum suyu için 1 ml Tremazol ekleyin. Deri çürüme-rine, Transversotrema ve tenyalara karşı: Her 20 litre akvaryum suyuyla 1 ml Tremazol ekleyin. Tremazol'u su üzerinde dağıtmak için ölçü ölçü kabı kullanın ve akvaryum suyunu bir kaşık veya bir cubukla karıştırın. 6 saat sonra en az %80 oranında su değiştirimi yapın. Bu zaman içinde su kiriliği meydana gelirse hemen su değiştirimi yapın.

Solungaç çürümesi görüldüğünde su değiştiriminin 7 gün sonra tedaviyi tekrarlayın.

Tedavi süresince UV lambalarını kapatın ve akvaryumu iyi havalandırın. Uygulama sırasında biyolojik filtreler açık kalabilir.

Tedavi bittiken sonra suyu sera super carbon ile filtre etmenizi öneriz.

Akvaryum düşında kira bari tanyo: Bu metodу özellikle su hacmi çok olduğunda öneririz.

İlk olarak küçük bir plastik kabı akvaryum suyuyla doldurunca daha sonra kullanma talimatına göre Tremazol ekleyin. Hasta balığı 20 dakika bu kabin içinde tutun ve daha sonra akvaryuma bırakın. Tedavi boyunca suyu iyi havalandırıldığınızdan emin olun (örn. Bir hafta tazi yardımilya).

Bileşen/100 ml: prazkvantel, 7,47 g.

Cocukları ve etyona ev hanımların ulaşamayacağı bir yerde kilitli saklayın. Gözlerle ve ciltte temasından kaçının. Oda sıcaklığında ve karantıkta muhafaza ediniz. Besin maddesi yapımımda kullanılan hayvanlar için kullanılmaz. Deniz kestanesi gibi dikenli hayvanların (Echinodermata) olduğu akvaryumlarda kullanmayın!